

DAWKOWANIE Cartylis™ REGIMEN

Pić 1 fiolkę dziennie, najlepiej przed śniadaniem, przez 12 tygodni. Kurację można powtarzać dla uzyskania optymalnych i długotrwałych rezultatów.



A-CART-002-EN-23V01



aptissen >

Swiss Technology

Chemin du Champ
des Filles 36A
1228 Plan-les-Ouates
Geneva/Switzerland

info@aptissen.pl
aptissen.com
cartylis.com

CARTYLIS
ARTICULATION REBOOST

Suplement żywności do picia

HYDROLIZOWANY KOLAGEN 10G



Wyrób nie stanowi zamiennika zdrowej i zróżnicowanej diety, czy zdrowego stylu życia. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Możliwa obecność cząsteczek na dnie fiolki wiąże się z wysokim stężeniem składników aktywnych i nie ma wpływu na jakość produktu. W przypadku zastosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, zasięgnąć porady lekarza.

Cartylis™, suplement diety do picia z
hydrolizowanym kolagenem, witaminami
C, D, E oraz selenem

**Hydrolyzowany
kolagen (Typ 1)**

10 g

Witamina C

45 mg

900IU*

Witamina D

5 µg

200IU*

Witamina E

12 mg

17,9IU*

Selen

27.5 µg

Bez zawartości sztucznych substancji słodzących,
glutenu, nabiału.

*International Unit/jednostka międzynarodowa



Kolagen

Strukturalna część składowa wielu tkanek, w
tym kości, tkanki chrzęstnej, ścięgien i skóry.



Witamina C

Przyczynia się do normalnego procesu
tworzenia kolagenu dla prawidłowego
funkcjonowania tkanki chrzęstnej i kości.



Witamina D

Przyczynia się do zachowania zdrowia kości.



Witamina E i selen

Przyczyniają się do ochrony komórek
przed stresem oksydacyjnym.

Trzymiesięczne badanie obserwacyjne
wykazało, że codzienne przyjmowanie
preparatu Cartylis znacząco redukuje ból i
sztywność w 12 tygodniu u pacjentów
cierpiących na przewlekły ból stawów*.
Redukcja była nawet bardziej zauważalna
u pacjentów z wyższymi wyjściowo
wynikami w skali bólu.

77%

pacjentów odczuło znaczącą poprawę (n=112)*

55%

poprawa w skali bólu w spoczynku (n=58)*

36%

poprawa w skali bólu podczas ruchu (n=94)*


42%

redukcja sztywności stawu (n=85)*

U pacjentów z umiarkowanymi objawami, z wyjściowym wynikiem w
skali VAS ≥ 30

Cartylis™ redukuje przewlekły ból stawów u pacjentów z osteoartrozą

Badanie wykazało istotną redukcję intensywności bólu stawów
zarówno w spoczynku, jak i w ruchu po trzech miesiącach
codziennej suplementacji preparatem Cartylis™. Redukcję
zaobserwowano w całej populacji i była ona jeszcze bardziej
wyraźna u pacjentów z wyższymi wyjściowo wynikami w skali bólu.




Ryc 1: Ból w ruchu. Pacjenci z wyjściowym wynikiem w skali bólu VAS ≥ 30 (n= 94). Pomiędzy 4 a 12 tygodniem, 68% pacjentów nie przyjmowało



*Vidovic E, Rigaudier F, Juhel C. (2023) Observational Study
Evaluating the Efficacy and Safety of Cartylis Food Supplement in
Patients Suffering from Chronical Joint Pain. J Nutraceuticals Food
Sci Vol:8 No:1

Cartylis™ poprawia funkcję stawów i redukuje sztywność

Pacjenci zgłaszali postępującą redukcję sztywności stawów
oraz poprawę funkcji stawów po 3 miesiącach codziennego
przyjmowania Cartylis™ intake. Sugeruje to, że suplement
może pomóc złagodzić funkcjonalną niepełnosprawność
związaną z przewlekłym bólem stawów.



Ryc 2: Ewolucja wyniku w skali VAS dla sztywności od wyniku
wyjściowego do 12 tygodnia. Pacjenci z wynikiem wyjściowym w
skali bólu ≥ 30 (n= 85).

Cartylis™ daje długofalową ulgę w przewlekłym bólu stawów bez istotnych działań ubocznych

W badaniu zaobserwowano, że suplementacja preparatem
Cartylis™ była przez pacjentów dobrze tolerowana.
Wskazuje to, że suplement jest bezpieczny w długofalowym
użyciu bez istotnych działań niepożądanych

Cartylis™ może zmniejszyć potrzebę zażywania leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów

Pomiędzy 4 a 12 tygodniem, 68% pacjentów nie przyjmowało
ani leków przeciwbólowych ani przeciwzapalnych. Wśród
konsumentów, liczba dni w miesiącu, w których zażywano leki,
wykazała tendencję spadkową. Sugeruje to, że suplement
może prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na leki.